



Общероссийская общественная организация  
**АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ-ОФТАЛЬМОЛОГОВ**

Межрегиональная образовательная программа  
Общероссийской общественной организации  
«Ассоциация врачей-офтальмологов»

### «Современные подходы к диагностике, мониторингу и лечению диабетической ретинопатии»

26 ноября 2020 г., 14:00 (МСК)

**Субъект РФ:** Центральный федеральный округ, Рязанская область

Трансляция пройдет из студии ФГБУ «НМИЦ глазных болезней имени Гельмгольца Минздрава РФ», расположенной по адресу: Москва, ул. Садовая-Черногрозская 14/19

- 13:50 – 14:00** Подключение участников
- 14:00 – 15:10** Научно-практическая конференция
- 15:10 – 15:20** Перерыв
- 15:20 – 16:20** Научно-практическая конференция
- 16:20 – 17:00** Дискуссия

**Благодарим наших партнеров:**



## ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

- 13:50 – 14:00** Подключение участников
- 14:00 – 14:10** Приветственное слово  
**Колесников А.В., Зайцева О.В.**
- 14:10 – 15:10** Современные методы визуализации сосудистых изменений сетчатки  
**Зайцева О.В.**
- 15:10 – 15:20** Перерыв
- 15:20 – 16:20** Мониторинг и лечение диабетической ретинопатии и диабетического макулярного отека  
**Бычков П.А.**
- 16:20 – 17:00** Дискуссия

### Спикеры:

**Колесников Александр Вячеславович**, Заведующий 2-м офтальмологическим отделением государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Клиническая больница имени Н.А. Семашко», руководитель офтальмологической клиники «Око», главный внештатный специалист офтальмолог

**Зайцева Ольга Владимировна**, заместитель директора по организационно-методической работе федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской Федерации, к.м.н.

**Бычков Павел Александрович**, заведующий отделением по лечению патологий сетчатки и зрительного нерва ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней им. Гельмгольца»



# 60:40

# ЛЕЧИТЬ ДАЛЬНОВИДНО



## Возможность улучшения зрения с помощью проактивного дозирования в режиме «лечить и увеличивать интервал»<sup>1</sup>

В исследовании ALTAR к 96-й неделе:

- До 60% пациентов достигли интервала между инъекциями **≥12 недель**<sup>2</sup>
- У >40% пациентов был достигнут интервал между инъекциями **16 недель**<sup>2</sup>

**Литература:** 1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Эйлеа® (ЛП-003544 от 17.04.2019). 2. Ohji M, Ayame A, Takahashi K, Kobayashi M, Terano Y. Two different treat-and-extend dosing regimens of intravitreal aflibercept in Japanese patients with wet age-related macular degeneration: 96-week results of the ALTAR study. Abstract and presentation: EURETINA 2018 Free Paper Sessions; September 2018; Vienna, Austria.

**ЭЙЛЕА®** Торговое наименование препарата: Эйлеа®. Международное непатентованное наименование: Афилиберцепт / Aflibercept. **Лекарственная форма:** раствор для внутриглазного введения. 1 мл препарата содержит 40 мг афилиберцепта. **Показания к применению** Препарат Эйлеа® показан взрослым пациентам для лечения: неоваскулярной («влажной» формы) возрастной макулярной дегенерации («влажной» формы ВМД); снижения остроты зрения, вызванного макулярным отеком вследствие окклюзии вен сетчатки (центральной вены (ОЦВС) или ее ветвей (ОВЦВС)); снижения остроты зрения, вызванного диабетическим макулярным отеком (ДМО); снижения остроты зрения, вызванного миопической хориоидальной неоваскуляризацией (миопической ХНВ). **Противопоказания** Повышенная чувствительность к афилиберцепту или любому другому компоненту, входящему в состав препарата; активная или подозреваемая интра- или периокулярная инфекция; активное тяжелое внутриглазное воспаление; беременность и период грудного вскармливания, за исключением случаев, когда потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода; возраст до 18 лет. **С осторожностью** При лечении пациентов с плохо контролируемой глаукомой (не следует вводить препарат Эйлеа® при внутриглазном давлении ≥ 30 мм рт. ст.); у пациентов, перенесших инсульт, транзиторную ишемическую атаку или инфаркт миокарда в течение последних 6 месяцев (при лечении ОЦВС, ОВЦВС, ДМО или миопической ХНВ); у пациентов с факторами риска нарушения целостности пигментного эпителия сетчатки. **Способ применения и дозы** Препарат Эйлеа® предназначен только для введения в стекловидное тело. Содержимое флакона следует использовать только для одной инъекции. Препарат Эйлеа® должен вводить только врач, имеющий соответствующую квалификацию и опыт интравитреальных инъекций. Рекомендованная доза препарата Эйлеа® составляет 2 мг афилиберцепта, что эквивалентно 50 мкл раствора. Подробная информация о способе применения и дозы, а также о частоте инъекций содержится в полной версии инструкции препарата Эйлеа®. **Побочное действие** Наиболее распространенные нежелательные реакции включали субконъюнктивальное кровоизлияние, снижение остроты зрения, боль в глазу, катаракта, повышение внутриглазного давления, отслойку стекловидного тела и плавающие помутнения стекловидного тела. **Часто:** разрыв пигментного эпителия сетчатки\*, отслойка пигментного эпителия сетчатки, дегенерация сетчатки, кровоизлияния в стекловидное тело, кортикальная катаракта, ядерная катаракта, субкапсулярная катаракта, эрозия роговицы, микроэрозии роговицы, затуманивание зрения, боль в месте введения, чувство инородного тела в глазу, слезотечение, отек века, кровоизлияния в месте введения, точечный кератит, инъекция конъюнктивы век, инъекция конъюнктивы глазного яблока. \*Состояния, связанные, как известно, с «влажной» формой ВМД. Наблюдались только в исследованиях с «влажной» формой ВМД. **Регистрационный номер:** ЛП-003544. Актуальная версия инструкции от 17.04.2019. **Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение:** Байер АГ, Леверкузен, Германия. **Производитель (Выпускающий контроль качества):** Байер АГ, Берлин, Германия. Отпускается по рецепту. Подробная информация содержится в инструкции по применению.

**URSAPHARM**  
Arzneimittel GmbH

Ваш эксперт в решении проблем «сухого глаза»  
Уже более 10 лет инновационные продукты для увлажнения глаз

**HYLO®**  
ЗАБОТА О ГЛАЗАХ



## Постоянное использование

**ХИЛО-КОМОД®** 0,1% гиалуроновая кислота

При легких и умеренных формах синдрома «сухого глаза»; до и после хирургического лечения. Лидер продаж в Германии\*  
Препарат года с 2007 по 2015 в Германии\*\*

До 3-й степени сухости

**ХИЛОМАКС-КОМОД®** 0,2% гиалуроновая кислота

Длительное интенсивное увлажнение  
Высокая концентрация и высокая вязкость  
При тяжелых формах синдрома «сухого глаза»

1-4 степень сухости

## Бережный уход и восстановление

**ХИЛОЗАР-КОМОД®** 0,1% гиалуроновая кислота + декспантенол

Увлажнение глаз и заживление повреждений  
Дневной уход. Вместо мази в течение дня  
При легких и умеренных формах синдрома «сухого глаза», способствует заживлению поврежденной глазной поверхности

До 3-й степени сухости

**ХИЛОПАРИН-КОМОД®** 0,1% гиалуроновая кислота + гепарин

Увлажнение и восстановление  
Уход при раздражении роговицы и конъюнктивы  
При легких и умеренных формах синдрома «сухого глаза», включая хроническое воспаление роговицы

До 3-й степени сухости

**ПАРИН-ПОС®** Гепарин

Защищает и поддерживает роговицу, конъюнктиву и веки. Бережная помощь при раздражении глаз. 24-х часовая быстрая и надежная защита от раздражения глаз

1-4 степень сухости

## Защита в ночное время

**ВИТА-ПОС®** Витамин А

Защита ваших глаз в ночное время. Улучшает свойства слезной пленки  
Ночной уход при всех формах синдрома «сухого глаза»

1-4 степень сухости

